

くすりのしおり

注射剤

2013年11月作成

<p>薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。</p>	
<p>商品名:ミオコール点滴静注 25mg 主成分:ニトログリセリン(Nitroglycerin) 剤形:注射剤 シート記載:</p>	
<p>この薬の作用と効果について 心臓をとりまく冠状動脈を拡げて血流量を増やし、心臓に酸素や栄養を補給するとともに、全身の血管の抵抗を減らして心臓の負担を軽くします。 通常、手術中の血圧の調整、手術中の過度の高血圧の改善、急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）または不安定狭心症に用いられます。</p>	
<p>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。閉塞隅角緑内障、貧血がある。・妊娠または授乳中・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
<p>用法・用量（この薬の使い方）</p> <ul style="list-style-type: none">・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>>・通常、点滴で静脈内に注射します。・血圧、心不全や狭心症の症状をみながら使用期間を決めていきます。	
<p>生活上の注意</p>	
<p>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、動悸、頭痛、頭重感、吐き気、嘔吐、乏尿などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・全身倦怠感、脱力感、めまい [急激な血圧低下、心拍出量低下] <p>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</p>	
<p>保管方法 その他</p>	
<p>医療担当者記入欄</p>	<p>年 月 日</p>

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。