

くすりのしおり

620003586

2009年4月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ナイクリン錠 50mg

主成分：ニコチン酸（Nicotinic acid）

剤形：白色の錠剤、直径 7.0mm、厚さ 2.4mm

シート記載：（表）501、ナイクリン 50mg、（裏）ナイクリン、50mg



この薬の作用と効果について

身体の新陳代謝を正常に保つ働きをもつビタミン B のひとつで、血管を拡張する作用があります。

通常、ニコチン酸の欠乏によって生じるいろいろな病気（口内炎、耳鳴、湿疹など）の予防や治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低血圧である。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ あなたの用法・用量は ：医療担当者記入
- ・ 通常、成人は主成分として 1 日 25～200mg を服用しますが、年齢、症状により適宜増減されます。本剤は 1 錠中に主成分 50mg を含有します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は 1 回飛ばして次の服用時間から通常どおり飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、くちびるの腫れ、咳、ショック様症状（顔面蒼白、冷汗、立ちくらみ）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。