

日本薬局方 プロパフェノン塩酸塩錠

プロノン錠100mg

プロノン錠150mg

【この薬は？】

| | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| 販売名 | プロノン錠100mg Pronon Tablets 100mg | プロノン錠150mg Pronon Tablets 150mg |
| 一般名 | プロパフェノン塩酸塩 Propafenone Hydrochloride | |
| 含有量 (1錠中) | 100mg | 150mg |

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、不整脈治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、心臓に作用し、心臓の異常な興奮を抑えて、脈の乱れを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

下記の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか又は無効の場合 頻脈性不整脈

- ・この薬は、体調が良くなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・うっ血性の心不全のある人
- ・高度の房室ブロック、高度の洞房ブロックのある人
- ・リトナビル、ミラベグロン、テラプレビル、アスナプレビルを使用中の入

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・心筋梗塞、弁膜症、心筋症などの基礎心疾患のある人
- ・刺激伝導障害（房室ブロック、洞房ブロック、脚ブロックなど）のある人
- ・明らかな洞性徐脈のある人
- ・肝臓に障害のある人
- ・高齢の人
- ・腎臓に重篤な障害のある人
- ・血液中のカリウム量が少ない人

○この薬には併用してはいけない薬 [リトナビル（ノービア）、ミラベグロン（ベタニス）、テラプレビル（テラビック）、アスナプレビル（スンペプラ）] や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

- ・この薬は、1回150mgを1日3回使用します。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間まで4時間以内の場合は、1回とばして次に指示された時間から1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を使用中は、定期的な心電図、脈拍、血圧、心胸比などの検査が行われます。特に次の患者さんは少量から使用が開始され、頻回に心電図が測定されます。
 - ・心筋梗塞、弁膜症、心筋症などの基礎心疾患のある人、心機能が低下している人
 - ・高齢の人
 - ・他の不整脈治療薬を飲んでいる人
 - ・肝臓に障害のある人、腎臓に重篤な障害のある人、
- ・めまいなどがあらわれることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には注意してください。

- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む食品はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？





特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用 | 主な自覚症状 |
|---------------------|---|
| 心室頻拍 しんしつひんぱく | 息切れ、動悸、脈が速くなる |
| トルサード ド ポアント | 気を失う、動悸、脈が速くなる、意識がなくなる、胸部異和感、胸の痛み |
| 心室細動 しんしつさいどう | 胸の不快感、胸の痛み、動悸、眼の前が暗くなる、めまい |
| 洞停止 どうていし | 気を失う、心臓が止まる、めまい |
| 洞房ブロック どうぼうブロック | めまい、胸の痛み、胸の不快感、動悸 |
| 房室ブロック ぼうしつブロック | めまい、胸の不快感、胸の痛み、気を失う、動悸 |
| 徐脈 じよみやく | めまい、意識の低下、考えがまとまらない、息切れ、脈がとぶ、脈が遅くなる、判断力の低下 |
| 失神 しっしん | 気を失う |
| 肝機能障害 かんきのうしょうがい | 皮膚が黄色くなる、嘔吐、白目が黄色くなる、尿が黄色い、吐き気、食欲不振、かゆみ、からだがだるい |
| 黄疸 おうだん | 皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる、白目が黄色くなる |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

| 部位 | 自覚症状 |
|-----|------------------------------------|
| 全身 | からだがだるい |
| 頭部 | 意識がなくなる、意識の低下、めまい、考えがまとまらない |
| 眼 | 眼の前が暗くなる、白目が黄色くなる |
| 口や喉 | 嘔吐、吐き気 |
| 胸部 | 息切れ、胸の不快感、胸の痛み、動悸、胸部異和感、心臓が止まる、吐き気 |
| 腹部 | 食欲不振、吐き気 |
| 手・足 | 脈が速くなる、脈が遅くなる、脈がとぶ |
| 皮膚 | 皮膚が黄色くなる、かゆみ |
| 尿 | 尿が黄色い、尿が褐色になる |
| その他 | 気を失う、判断力の低下 |

【この薬の形は？】

| 販売名 | プロノン錠100mg | プロノン錠150mg |
|--------|---|---|
| PTPシート |  |  |
| 形状 | 円形のフィルムコーティング錠 | |
| |  |  |
| 直径 | 7.6mm | 8.6mm |
| 厚さ | 3.5mm | 4.0mm |
| 重さ | 140mg | 220mg |
| 色 | 白色 | 白色 |
| 識別コード | 548 | 547 |

【この薬に含まれているのは？】

| | |
|------|--|
| 有効成分 | 日本薬局方 プロパフェノン塩酸塩 |
| 添加物 | 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、結晶セルロース、メチルセルロース、タルク、ステアリン酸カルシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン |

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直接日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：トーアエイヨー株式会社

(<http://www.toaeiyo.co.jp/>)

信頼性保証部

電話番号：0120 - 387 - 999 048-648-1070

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、弊社の休業日を除く）