

# アミオダロン<sup>®</sup>塩酸塩速崩錠 50mg「TE」 100mg「TE」 を服用される方へ

監修：済生会熊本病院 循環器内科 不整脈先端治療部門 最高技術顧問

奥村 謙



- アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」は、異常な心臓の興奮を鎮めて脈を正常化することを目的とする、不整脈のお薬です。
- このお薬は、水で速やかに崩壊するように工夫された錠剤です。水と一緒に服用してください。また、湿気や光を避けて保存してください。
- お薬を飲み始めてから効果が現れるまで1～2週間かかります。
- 勝手にお薬の量や飲み方を変えたり、中止したりするような自己流のやり方は危険です。**主治医の指示に従って正しく服用**してください。
- このお薬には、一緒に飲んではいけない薬があります。現在飲んでいるお薬がある場合は、必ず主治医または薬剤師にご相談ください。また、今後他の医師を受診する場合や、他のお薬を飲む場合は、事前に必ずこのお薬を飲んでいることを医師または薬剤師にお伝えください。

(裏面もご覧ください)

● このお薬は正しく服用していても特有の副作用が現れることがあります。次の様な症状に気付いたら、ただちに主治医または薬剤師に相談してください。

息苦しい、咳、  
血の混じった痰、  
発熱(微熱)



胸の痛み、  
息切れ、  
動悸



皮膚が黄色くなる、  
からだがだるい、  
食欲不振




● 副作用の発現を防ぐため、主治医から指示される診察・検査は定期的に受けてください。

脈拍、血圧



心電図検査、  
心エコー検査、  
胸部レントゲン検査



肺機能検査、  
血液検査、  
尿検査



いつもと違うと感じたら主治医にご相談ください。