


エルトロンボパグ錠 12.5mg[F] 25mg[F]

を服用される慢性免疫性血小板減少症患者さんへ

服用に際して注意していただきたいこと

- 食事や金属含有製剤(カルシウムや鉄などのミネラルを含む薬・サプリ)などは、下記の通り摂取を避ける
- 食事全般：このおくすりの服用前2時間／後2時間は避ける
- 金属含有製剤・乳製品：このおくすりの服用前4時間／後2時間は避ける



- これらサプリメント・薬を服用されている方、またその他の薬を服用されている方は、主治医または薬剤師にお伝えください。



エルトロンボパグ錠[F]の取り出し方法



乳幼児の誤飲を防ぐため、PTPシートから錠剤が取り出しにくくなっています。

強く押し出してください

服用に際して注意していただきたいこと(つづき)

- 主治医から指示された回数や量を守りましょう。

あなたが飲むのは

mg 錠を1日1回 錠です。

※用法・用量は症状によって異なるので、医師の指示を必ずお守りください。

- エルトロンボパグ錠「F」は、体の中で血小板を作るはたらきを助けて血小板を増やすことにより、出血を防ぐ作用のおくすりです。
- 飲むのをやめてしまうと、血小板の数が服薬前のレベルに戻ってしまい出血しやすくなることがあります。ご自分の判断で飲むことを中止しないようにしましょう。
- 間違えて一度にたくさん飲んでしまった場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- 服用予定時刻に飲み忘れてしまった場合は、その日は飲み忘れた分を服用しないでください。翌日は決められた錠数のみを服用し、絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

エルトロンボパグ錠「F」を服用される前に

次のような方は、服用される前に主治医または薬剤師にお伝えください。

- これまでに、エルトロンボパグ錠を服用してアレルギー症状が出たことがある方
- 肝機能障害のある方
- 血のかたまり(血栓)がしやすい体質や病気のある方
- 妊婦または妊娠している可能性のある方
- 授乳中の方

服用中は以下のことに注意してください

- このおくすりの副作用として、肝機能障害、血栓塞栓症、出血(服用中止後)、白内障、頭痛、疲労などがあります。
- このような症状を感じたら、医師または薬剤師にご相談ください。