

V₂-受容体拮抗剤

劇薬、処方箋医薬品 (注意—医師等の処方箋により使用すること)

トルバプタン口腔内崩壊錠

薬価基準収載



トルバプタンOD錠 3.75mg「TE」
7.5mg「TE」・15mg「TE」

Tolvaptan OD Tablets 3.75mg「TE」・7.5mg「TE」・15mg「TE」

「効能又は効果」、「用法及び用量」追加承認取得のご案内

謹啓

時下、益々ご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび、V₂-受容体拮抗剤『トルバプタンOD錠3.75mg「TE」・7.5mg「TE」・15mg「TE」』につきまして、下記の通り「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加承認を取得しましたので、ご案内申し上げます。

今後とも『トルバプタンOD錠「TE」』に、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白


2026年4月

トーアエイヨー株式会社

●追加承認された効能又は効果、用法及び用量 (下線部)


効能又は効果	用法及び用量	3.75mg	7.5mg	15mg
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	通常、成人にはトルバプタンとして15mgを1日1回経口投与する。	○	○	○
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留	通常、成人にはトルバプタンとして7.5mgを1日1回経口投与する。	○	○	
腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	通常、成人にはトルバプタンとして1日60mgを2回(朝45mg、夕方15mg)に分けて経口投与を開始する。1日60mgの用量で1週間以上投与し、忍容性がある場合には、1日90mg(朝60mg、夕方30mg)、1日120mg(朝90mg、夕方30mg)と1週間以上の間隔を空けて段階的に増量する。なお、忍容性に応じて適宜増減するが、最高用量は1日120mgまでとする。	○	○	○

今回の「効能又は効果」「用法及び用量」の追加に伴い、「効能又は効果に関連する注意」「用法及び用量に関連する注意」の追記を行っております。詳細につきましては、電子添文をご参照いただけますようお願い申し上げます。




[3.75mg]

直径:5.6mm
厚さ:2.3mm



[7.5mg]

直径:(長径)7.8mm
(短径)4.4mm
厚さ:3.1mm



[15mg]

直径:8.6mm
厚さ:3.7mm

※製品外観は2026年4月時点のものです。

製品情報はこちら

URL
<https://med.toaeiyo.co.jp/products/tolvaptan/>



適正使用のための資料はこちら

URL
<https://med.toaeiyo.co.jp/contents/tva-inst/>



薬効分類名/製品名	規格	包装
V ₂ -受容体拮抗剤 トルバプタンOD錠 3.75mg「TE」	3.75mg	20錠[PTP(10錠×2)], 100錠[PTP(10錠×10)]
トルバプタンOD錠 7.5mg「TE」	7.5mg	20錠[PTP(10錠×2)], 100錠[PTP(10錠×10)]
トルバプタンOD錠 15mg「TE」	15mg	20錠[PTP(10錠×2)], 100錠[PTP(10錠×10)]

先発医薬品名: サムスカOD錠

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等の詳細については、電子添文をご参照ください。

[お問い合わせ先] トーアエイヨー株式会社 くすり相談窓口 / 電話 0120-387-999

