


ソタロール 塩酸塩錠 40mg「TE」・80mg「TE」

を服用される患者さまへ

ソタロール塩酸塩錠「TE」は、異常な心臓の興奮を鎮めて脈を正常化することを目的とする、不整脈のおくすりです。



あなたが処方されたお薬



飲む量は、症状に合わせて医師と相談して決まります。
下記の量のおくすりを、服用してください。

あなたが飲むのは **1回** **錠** です。

※用法・用量は症状によって異なるので、医師の指示を必ずお守りください。

このおくすりの副作用には、徐脈、頭痛、立ちくらみ、吐き気、全身倦怠感、易疲労感といった症状があります。

このような症状を感じたら、医師または薬剤師にご相談ください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 動悸、息切れ、めまい [心室細動、心室頻拍、Torsades de pointes、洞停止、完全房室ブロック]
- 息切れ、全身のむくみ、咳が出る [心不全、心拡大]

Pick up 不整脈ってどんな病気？

心臓の規則正しい拍動（心臓の収縮）は、心臓内の洞結節と呼ばれる場所で作り出される電気信号によってコントロールされています。この電気信号は、刺激伝導系と呼ばれる心臓内の電気の回路を通して伝わっていきます。

不整脈とは、この電気信号が乱れ、拍動のリズムが乱れている状態を指します。おもに、脈が速くなる頻脈性不整脈、脈が遅くなる徐脈性不整脈に分けられます。また、異常が起こる部分によって分類すると、心室より上部に異常がある上室性不整脈、心室に異常がある心室性不整脈の2タイプに分けられます。

●不整脈の種類

不整脈は、拍動の状態によって、大きく次の2つに分類されます。

頻脈性不整脈

拍動が1分間に
100回を超える場合

徐脈性不整脈

拍動が1分間に
50回未満のケース

不整脈の種類

頻脈性不整脈

心房性（上室性）

心室性

心房期外収縮
発作性上室頻拍

心室期外収縮
心室頻拍

心房粗動
心房細動

心室細動
(心室粗動を含む)

徐脈性不整脈

洞不全症候群
伝導ブロック（房室ブロック、脚ブロック）

心臓の構造（刺激伝導系）

