

くすりのしおり

内服剤

2021年12月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ソタロール塩酸塩錠 80mg 「TE」

主成分：ソタロール塩酸塩(Sotalol hydrochloride)

剤形：微青色の割線入り錠剤、直径 8.1mm、厚さ 4.4mm

シート記載：（表）ソタロール「TE」、80mg、不整脈治療剤
（裏）ソタロール「TE」、80mg



この薬の作用と効果について

β受容体遮断作用、カリウムチャネル遮断作用により、不整脈の一因である交感神経系の緊張を抑え、脈を正常化させます。

通常、心室頻拍や心室細動の再発性不整脈の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心原性ショック、うっ血性心不全、腎障害、洞性徐脈、刺激伝導障害、気管支喘息、気管支けいれん、QT延長症候群がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回1/2錠（主成分として40mg）から開始され、1日2回服用します。効果が不十分な場合は徐々に1回2錠（160mg）まで増量され、1日2回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、1回飛ばして次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、徐脈、頭痛、立ちくらみ、吐き気、全身倦怠感、易疲労感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・動悸、息切れ、めまい [心室細動、心室頻拍、Torsades de pointes、洞停止、完全房室ブロック]
- ・息切れ、全身のむくみ、咳が出る [心不全、心拡大]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。