

# くすりのしおり

内服剤

2021年06月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：タダラフィル錠 20mgAD「TE」

主成分：タダラフィル(Tadalafil)

剤形：うすい赤褐色の錠剤、直径 7.5mm、厚さ 3.4mm

シート記載：（表）タダラフィル、AD、20mg、「TE」、肺動脈性肺高血圧症のくすり  
（裏）タダラフィル 20mg AD「TE」、ニトログリセリンなどの硝酸薬と本剤は併用できません。



## この薬の作用と効果について

肺血管平滑筋のホスホジエステラーゼ 5 (PDE5) という酵素を阻害して、血管を弛緩させることにより肺動脈圧と肺血管抵抗を低下させます。

通常、肺動脈性肺高血圧症の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎障害、肝障害、最近 6 ヶ月以内の脳梗塞・脳出血の既往、不整脈、低血圧、高血圧、網膜色素変性症がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は 1 回 2 錠（主成分として 40mg）を 1 日 1 回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、1 回飛ばして次の通常の服用時間に 1 回分を飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・めまいや視覚障害（眼のかすみなど）があらわれることがありますので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する際には十分注意してください。
- ・グレープフルーツジュースは薬の作用を増強させ、副作用も強める可能性があるため、控えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、潮紅、筋痛、吐き気などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・発疹、顔のむくみ、唇や口内・結膜のただれ [過敏症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。