

# 医療関係者の方へ

ユリノーム錠25mg、ユリノーム錠50mgを交付される際は、裏面の内容をご参照ください。患者様には、2枚目以降をお渡しください。

トーアエイヨー株式会社  
信頼性保証部  
0120-387-999

裏面もお読みください

## 留意事項

1. 服用前に肝機能検査を実施し、肝機能異常がないことを確認してください
2. 服用開始から少なくとも6ヶ月間は必ず定期的に肝機能検査を実施し、それ以降も定期的に肝機能検査をしてください
3. 副作用として肝障害が発生する可能性があることをあらかじめ患者様にご説明ください
4. 服用中に肝機能異常が認められた場合にはただちに服用を中止してください

## ユリノーム錠を交付される際の注意事項

ユリノーム錠は痛風・高尿酸血症<sup>注1)</sup>の改善・治療を目的とする薬剤ですが、重篤な肝障害<sup>注2)</sup>が主に投与開始から6ヶ月以内に報告されています。(発現頻度0.09%[4,659例中4例]：使用実態下における安全性及び有効性に関する調査) 本剤を服用される患者様に対しては、上記1.～4.の事項にご留意くださいますようお願い申し上げます。

### 注1) 効能・効果

下記の場合における高尿酸血症の改善

痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症

注2) 重篤な肝障害：AST(GOT)、ALT(GPT)が500IU/L以上の症例もしくは副作用治療のために入院を要した症例

- 詳細は製品添付文書等をご参照ください。
- 警告、禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご注意ください。

2020年4月改訂

URN03002-202004-G FC

ユリノーム錠をお飲みになる方へ

## 必ずお読みください

ユリノーム錠は、血液中の尿酸を尿中に排泄させて、痛風・高尿酸血症を治療するお薬です。

### このお薬をお飲みになる前に

次のような方は、医師又は薬剤師にお伝えください。

- 肝臓の病気にかかっている
- 肝臓の検査値に異常があるといわれている
- お薬でアレルギーを起こしたことがある

患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが低下することがあり、主に飲み始めてから6ヶ月以内に多く認められています。

お薬を飲んでいる期間中は定期的に  
肝機能検査を受けましょう。

裏面もお読みください

# 肝臓の働きが低下したときに よくみられる症状

- 食欲がなくなったり、体がだるくなったと感じる（けんたい感）
- 尿の色が濃く（茶色く）なる
- 皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）
- 吐き気や下痢、発熱
- 体がかゆくなる
- 発疹がでる

このような症状に気づいたときは、  
服用を中止し、すぐに医師又は薬剤師  
に相談してください。

病医院・薬局名